

Mycostop

Mode d'emploi

■ Généralités

Mycostop est un fongicide microbien, principalement efficace contre la fusariose et le pythium. Il améliore la croissance et le développement des racines et des parties aériennes de la plante. L'efficacité de Mycostop est prouvée sous diverses conditions climatiques. Il est actif sur une large plage de température (15 à 30 ° C), à un pH compris entre 5.3–7.5. Il est efficace sur différents substrats et sur les racines de nombreuses cultures.

■ Matière active

Streptomyces griseoviridis K-61
(1 x 10⁸ cfu / g) 30 %
Contenu inactif 70 %

■ Domaine d'application

Remarques préliminaires

Il faut appliquer Mycostop dès que possible dans le cycle d'une culture pour obtenir une efficacité optimale. L'application est faite sur les racines. Il est recommandé de répéter le traitement 2-3 fois à un intervalle de 4 semaines.

Cultures maraîchères (concombres)

Fusarium, Pythium (cultures en substrat)
0,01% ou 5 g / 1000 plantes

Horticulture (cyclamen, gerbera, oeillet)

Fusarium
0,01% ou 2-5 g / 1000 plantes ou par m³ de substrat

Application

Appliquez une quantité suffisante de suspension pour assurer une bonne infiltration dans le substrat de culture et dans le sol tout en évitant un lessivage. Sur de petites surfaces, il est possible d'appliquer la bouillie avec un arrosoir ou une pompe à traiter. Pour les grandes surfaces, il est possible d'utiliser un appareil doseur (par ex. AquaNemix 2%).

■ Délai d'attente

Aucun délai d'attente.

■ Préparation de la bouillie

Ajouter un peu d'eau à la quantité nécessaire de Mycostop et bien mélanger. Compléter avec de l'eau jusqu'à la quantité voulue. Pour obtenir une suspension homogène, mélanger continuellement.

■ Miscibilité

Ne jamais mélanger Mycostop avec un autre produit dans la pompe à traiter. Appliqué séparément,

Mycostop est compatible avec la plupart des fongicides, engrais liquides et insecticides/ acaricides. Vous obtiendrez des détails plus précis sur les possibilités de combinaison auprès de votre conseiller.

■ Stockage

Stocker entre 4 et 8 °C. Tenir hors gel. Utiliser, si possible, la totalité de l'emballage après ouverture. Une fois ouvert, le produit ne se conserve pas bien.

■ Transport

Pas des restrictions.

■ Premiers secours

Après inhalation:

Eloigner la personne concernée de la zone à risque et la conduire à l'air libre. En cas de signe d'intoxication, demander un conseil médical. Pas d'antibiotique connu. Si nécessaire, traiter de façon symptomatique.

Après un contact avec la peau:

Nettoyer les parties concernées avec de l'eau et du savon. En cas de signe d'intoxication, demander un conseil médical. Pas d'antidote connu. Si nécessaire, traiter de façon symptomatique. Retirer les vêtements humectés.

Après un contact avec les yeux:

Eloigner la personne concernée de la zone à risque. Rincer de suite avec beaucoup d'eau jusqu'à la diminution de l'irritation (min. 10 minutes). Si l'irritation persiste ou qu'il reste des signes d'intoxication, demander un conseil médical. Pas d'antidote connu.

Après ingestion:

Eloigner la personne concernée de la zone à risque. Faire vomir en donnant de l'eau, uniquement si la personne est consciente. Ne rien administrer si la personne est inconsciente. Consulter un médecin.

■ Elimination

Utilisation des restes: appliquer les éventuels restes de bouillie et de nettoyage des appareils sur la surface traitée préalablement. Les soldes de produit peuvent être versés sur le compost, sur le tas de fumier ou éliminés avec les ordures ménagères.

Rincer les emballages vides et les éliminer avec les ordures ménagères.

■ Responsabilité

En cas de dégâts sur les cultures qui sont dus à un non respect du mode d'emploi, la firme Andermatt Biocontrol SA décline toute responsabilité.